

# Giacoccide®

Sulfadimetoxina - Dimetridazol

**Coccidicida**

**Giardicida**

**Antibacteriano**

## COMPOSICIÓN:

GIACOCOCIDE AMARILLO contiene:

Dimetridazol 16,5 mg; Sulfadimetoxina 25 mg cada comprimido.

GIACOCOCIDE VERDE contiene:

Dimetridazol 165 mg; Sulfadimetoxina 250 mg cada comprimido.

GIACOCOCIDE ROJO contiene:

Dimetridazol 330 mg; Sulfadimetoxina 500 mg cada comprimido.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Coccidicida - Giardicida - Antibacteriano.

## INDICACIONES DE USO:

Tratamiento específico de las coccidiosis en perros y gatos, frecuentemente asociadas con giardiasis complicantes de las enteritis en cachorros y adultos. Pielonefritis, infecciones del aparato genital, infecciones respiratorias e infecciones producidas por gérmenes sensibles a la sulfamidoterapia o al dimetridazol.

## DOSIFICACIÓN:

Comp. AMARILLOS para animales de bajo peso:

1 comprimido cada 1 kg de peso, 2 veces por día, durante 10 días.

Comprimidos VERDES para animales medianos:

1 comprimido cada 10 kg de peso, 2 veces por día, durante 10 días.

Comprimidos ROJOS para animales de 20 kg de peso o más:

1 comprimido cada 20 kg de peso, 2 veces por día, durante 10 días.

En caso de infección severa puede duplicarse la dosis de la primera toma, de modo de obtener en sangre una alta dosis de ataque, la dosis normal será mantenida luego por 10 ó hasta 15 días.

*La dosis diaria de acuerdo al peso de los animales puede ser administrada en una sola toma en los casos de tratamientos de las disbacteriosis o solo de coccidios.*

*Tratamiento preventivo:*

**Cachorros:** 1ra. Dosis, a los 7 ó 10 días de edad. 2da. dosis a los 15 ó 20 días de finalizada la primera dosis (a los 35 ó 45 días de edad) preparándolos para el destete.

**Tiempo de administración:** 10 días. Continuar desparasitando cada 20 días hasta los 4 meses de edad, o toda vez que se encuentre en riesgo de re-infección.

**Adultos:** Administrar a los adultos, antes del ingreso de animales jóvenes al mismo ambiente.

## IMPORTANTE:

Se debe controlar que el animal no se reinfecte por comer materia fecal o tomar agua de fuentes o charcos contaminados.

### CONTRAINDICACIONES:

Las sulfas no deben administrarse con otros antibióticos bactericidas, ni con amino glucósidos. No administrar con calcio o con antiácidos por disminuir su absorción intestinal. No administrar Dimetridazol más de 20 días.

No administrar durante la preñez ni durante la lactancia. En caso de sensibilidad a los componentes, suspender la medicación.

Se recomienda hacer descansos de 20 días para repetir la medicación. Administrar con abundante agua. La sulfadimetoxina puede ser nefrotóxica. Usada en las dosis que se indican el producto no es tóxico.

No utilizar en animales con hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Centro de intoxicaciones: 0800 333 0160

Almacenar en lugar fresco y seco, conservar entre 15 y 25°C.

Vencimiento: 2 años a partir la fecha de elaboración.

### PRESENTACIÓN:

**Giacoccide Rojo:** caja conteniendo dos blister por 10 comprimidos y presentación hospitalaria por 10 blisters.

**Giacoccide Verde:** caja conteniendo dos blister por 10 comprimidos y presentación hospitalaria por 15 blisters.

**Giacoccide Amarillo:** caja conteniendo un blister por 20 comprimidos y presentación hospitalaria por 10 blisters.



SENASA

GIACOCIDE ROJO Cert. N° 96.361

GIACOCIDE AMARILLO Cert. N° 96.362

GIACOCIDE VERDE Cert. N° 96.363

Establecimiento elaborador N°: 8.471

Laboratorio MAYORS de Especialidades Veterinarias, propiedad de Mayors S.R.L.

Dir. Técnico: Dra. Ana M. Robles - Med. Vet. M.P. 2626

Uso veterinario

Industria Argentina



Andrade 2440 (1832) Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4283-2248

info@mayorslab.com.ar | [www.mayorslab.com.ar](http://www.mayorslab.com.ar)